NOTA GEOLÓGICA

Geoquímica de las rocas plutónicas del batolito cambro-ordovícico del Cordón de Lila y de la Sierra de Almeida, Región de Antofagasta, Chile

Hans Niemeyer Rubilar¹

¹ *Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad Católica del Norte, Angamos 0610, Antofagasta, Chile.
hansn@ucn.cl*

RESUMEN. En el Cordón de Lila y la Sierra de Almeida, región de Antofagasta, norte de Chile, afloran rocas plutónicas graníticas pertenecientes a un batolito cambro-ordovícico (490-460 Ma) que forma parte del arco magmático famatiniano. Los plutones que lo constituyen son de composición granodiorítica y monzogranítica, respectivamente. Los primeros ocupan una posición occidental en tanto que los segundos, oriental. La diferencia geoquímica entre ambos tipos de rocas es el enriquecimiento en sílice y K de las segundas respecto de las primeras. La mayoría de las granodioritas son metaluminosas o están en el límite entre el campo metaluminoso y el campo peraluminoso. Los monzogranitos son marcadamente peraluminosos. La composición química de los plutones (elementos mayores, en trazas y elementos de las tierras raras) permite inferir un origen común para ambos grupos, a partir de un magma máfico que evolucionó por cristalización fraccionada. Las diferencias de composición entre ambos, en particular su carácter meta- o peraluminoso, puede ser explicado por diferentes grados de interacción del magma con las rocas corticales félsicas.

Palabras clave: Batolito famatiniano, Geoquímica, Granodioritas, Monzogranitos.

ABSTRACT. *Cordón de Lila-Sierra de Almeyda Cambro-Ordovician batholith: geochemistry of the plutonic rocks.* Antofagasta region, Chile. An Upper Cambrian-Ordovician (490-460 Ma) batholith crop out along the Cordón de Lila and Sierra de Almeida, in the Antofagasta region, northern Chile, which belongs to the Famatinian arc. Two plutonic rock types can be distinguished: granodiorites and monzogranites. The first lithology is positioned along an occidental fringe in as much the second is located along an oriental part of the batholith. The main geochemical difference between the two lithologies is the enrichment in silica and K of the second with respect of the first one. Most of the granodiorites are metaluminous or are located between the metaluminous and peraluminous fields. The monzogranites are mostly peraluminous. The chemical composition of the plutons (major and trace elements and rare earth elements) allow to infer a common origin for both groups, from a mafic magma that evolved by fractional crystallization. The difference in composition between both lithologies, specially the meta or peraluminous character, can be explained by means a different degree of interaction of the original magma with the felsic crustal rocks.

Keywords: Famatinian batholith, Geochemistry, Granodiorites, Monzogranites.

1. Introducción

El orógeno famatiniano representa un evento mayor desarrollado en el borde occidental de Gondwana en el Paleozoico temprano. El arco magmático emplazado durante este evento se extiende desde las sierras pampeanas en Argentina hasta el norte de los Andes en Venezuela (Ramos, 2018). En el área que comprende el Cordón de Lila (CL) y la Sierra de Almeida (SA), ubicada inmediatamente al sur del salar de Atacama, en el norte de Chile (Fig. 1), afloran rocas plutónicas graníticas pertenecientes a un batolito que forma parte del arco magmático famatiniano (Ducea *et al.*, 2015), localmente denominado en Argentina Faja Eruptiva de la Puna Occidental (Palma *et al.*, 1986), de orientación general noroeste. Este arco magmático se desarrolló sobre la corteza continental por subducción dirigida hacia el noreste (Bahlburg y Hervé, 1997), a lo largo del borde occidental de Gondwana durante el Cámbrico superior (Furongiano) a Ordovícico Medio (Zimmermann *et al.*, 2010; Niemeyer *et al.*, 2018), y abarcó un lapso de ca. 30 Ma entre 490 y 460 Ma (Niemeyer *et al.*, 2014).

El batolito que constituye el Cordón de Lila y la Sierra de Almeida presenta extensos afloramientos que han permitido su estudio detallado. Las características petrográficas de cada uno de los diferentes plutones que lo componen están bien establecidas y sus relaciones de contacto mutuas y con su roca de caja son claras y

definidas (Mpodozis *et al.*, 1983; Niemeyer, 2013). Dentro del batolito cambro-ordovícico (490-460 Ma) se pueden distinguir dos litologías principales de rocas plutónicas: granodioritas y monzogranitos (Fig. 2). El objetivo de la presente nota es dar a conocer el carácter geoquímico de los plutones que conforman dicho batolito, a la vez que sugerir ideas acerca de su origen.

2. Marco geológico

La roca de caja del batolito cambro-ordovícico del Cordón de Lila y de la Sierra de Almeida está formada por el Complejo ígneo-sedimentario del Cordón de Lila (CISL) (Niemeyer, 1989). Este se compone de dos miembros sub-contemporáneos a la edad de los plutones del batolito (490-460 Ma, Niemeyer *et al.*, 2014). El miembro inferior, de ca. 2.500 m de espesor, está compuesto de lavas basálticas con niveles intercalados de turbiditas (Zimmermann *et al.*, 2010). El miembro superior lo conforman unos 200 m de dacitas y brechas dacíticas, también con intercalaciones de turbiditas. Una edad ordovícica media ha sido asignada a este último, sobre la base de dos determinaciones U-Pb en zircones individuales (471 ± 6 Ma y $468 \pm$ Ma) obtenidos en clastos de las brechas dacíticas (Niemeyer *et al.*, 2018). Además, en la parte superior del Plutón Tambillo aflora un *roof-pondant* kilométrico de roca sedimentaria no turbidítica (Fig. 3), cuya edad es

FIG. 1. Ubicación del área estudiada, en la precordillera de Antofagasta entre los salares de Atacama y Punta Negra. CL: Cordón de Lila, SA: Sierra de Almeida.

FIG. 2. **A.** Composición petrográfica de granodioritas y monzogranitos en diagrama QAP de Streckeisen (1974). Mineralogía según la norma C.I.P.W. **B.** Fotografía de una muestra granodiorítica del Plutón Pingo-Pingo, nótese la abundancia de biotita y anfíbola junto a cuarzo y plagioclasa. **C.** Fotografía de una muestra de monzogranito del Plutón Tilopozo en la que se ha teñido de amarillo el feldespato alcalino para destacar su abundancia.

FIG. 3. Distribución de los plutones del batolito cambro-ordovícico del Cordón de Lila y Sierra de Almeida, al sur del salar de Atacama. Se distingue, en general, una composición granodiorítica en los plutones en posición occidental y una composición monzogranítica en los plutones en posición oriental.

desconocida y que probablemente corresponda a un equivalente de la Formación Puncoviscana *sensu lato*, de edad proterozoica superior a cámbrica presente en Argentina (Aceñolaza y Aceñolaza, 2005).

El contacto de los diferentes plutones del batolito con su roca de caja es neto, con desarrollo en ellas de una aureola de rocas córneas de unos 50 m de ancho. Se caracterizan por haberse emplazado en la epizona a <10 km de profundidad (Valencia, 2014). Los plutones son isótropos con excepción del Plutón El León, que presenta una marcada foliación magmática (Carrasco, 2015).

En general, los plutones granodioríticos (Pedregoso, Pingo-Pingo, El León y Choschas) ocupan una posición más bien occidental dentro del batolito, en tanto que los plutones monzograníticos (Tucúcaro, Tilopozo, Portezuelo, Tambillo y Alto del Inca) lo hacen en una posición oriental (Fig. 3).

La naturaleza del basamento del CISL se puede inferir a partir de los numerosos xenolitos de rocas metamórficas presentes en el Plutón El León y del *roof-pendant* alojado en el Plutón Tambillo. Los xenolitos son de tamaño centimétrico a decamétrico y se componen de micaesquistos, rocas sedimentarias calcosilicatadas y, en menor proporción y tamaño, anfibolitas. Estos xenolitos sugieren la presencia de un basamento de probable edad mesoproterozoica (Pankhurst *et al.*, 2016).

3. Metodología

Se determinó la composición química de 28 muestras de roca de los diferentes plutones que conforman el batolito (Tablas 1 y 2). Los análisis químicos de elementos mayores y trazas fueron realizados en el Laboratorio Químico del Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, Chile. Para ello se utilizó una combinación de técnicas analíticas y preparación de muestras que incluyen fusión y digestión ácida (elementos mayores y trazas) y determinación de los contenidos por espectrometría de acoplamiento inductivo con detector de masa (ICP-MS) y espectrometría de absorción atómica (EAA).

4. Resultados

El contenido de elementos mayores y en trazas determinado en las muestras analizadas se presenta en las tablas 1 y 2 para las granodioritas y los monzogranitos, respectivamente. La mayor parte

de los valores de las determinaciones de pérdidas por calcinación (ppc) en cada muestra son menores al 1% en peso, lo cual es considerado como un indicador de que las muestras analizadas presentan un bajo grado de alteración, lo que permite inferir que su composición química no ha sufrido cambios significativos.

4.1. Elementos mayores

Las muestras de ambas litologías tienen un rango de variación en sus contenidos de SiO₂ entre 65 y 77 peso % con un aparente *gap* entre 73 y 74 peso %. En los diagramas de Harker (Fig. 4) se advierte que, en general, en ambas litologías la variación de los elementos mayores con respecto a los contenidos de SiO₂ definen patrones lineales de diferenciación, los cuales tienen la misma pendiente, especialmente el MgO₂, Fe₂O₃, Al₂O₃ y TiO₂. La variación de CaO con la sílice es también lineal en descenso con la misma pendiente para ambas litologías, con un *gap* de CaO en 2,38% en las granodioritas y 1,31% de CaO en los monzogranitos (Fig. 4).

En el diagrama Na₂O+K₂O-CaO *versus* SiO₂ (Frost *et al.*, 2001), las granodioritas se distribuyen a lo largo de la serie cálcica y los monzogranitos lo hacen, en su mayoría, en el campo de la serie calcoalcalina y, parcialmente, en el campo de la serie álcali-cálcica. Sin embargo, parte de los análisis de monzogranitos caen hacia la derecha del diagrama, en un sector donde no hay división de campos (Fig. 5A).

Por otro lado, en el diagrama de SiO₂ *versus* K₂O (Rickwood, 1989) las granodioritas ocupan el campo normal de la serie calcoalcalina en tanto que los monzogranitos se distribuyen en el campo de la serie calcoalcalina rica en K, aunque, dado su contenido de SiO₂, la mayor parte de las muestras exceden hacia la derecha las divisiones establecidas por ese autor (Fig. 5B).

El diagrama molar de Shand (1943) de A/NKC *versus* A/NK indica que la mayoría de las granodioritas son metaluminosas o están en el límite entre el campo metaluminoso y el peraluminoso, con una muestra en el campo de las rocas peraluminosas. La mayor parte de los monzogranitos son peraluminosos, con excepción de una muestra, que es metaluminosa (Fig. 5C). Adicionalmente, con la excepción del Plutón Tambillo, el resto de los plutones monzograníticos presentan corindón normativo >1%, lo cual significa un exceso de Al₂O₃ con respecto a CaO.

TABLA 1. ANÁLISIS QUÍMICOS DE GRANODIORITAS DEL BATOLITO DEL CORDÓN DE LILA Y LA SIERRA DE ALMEIDA.

Plutón	Pedregoso			Pingo-Pingo						Choschas				El León
Muestra	TON1	TON2	TON3	PP02	PP07	PP15	PP17	PP19	PP20	CH07	CH08	CH10	CH11	TON
SiO ₂ %	65,36	66,93	68,85	73,15	69,82	68,49	71,65	72,06	69,58	65,38	67,45	64,73	64,88	70,19
TiO ₂ %	0,42	0,41	0,3	0,21	0,28	0,38	0,25	0,2	0,27	0,47	0,36	0,44	0,46	0,42
Al ₂ O ₃ %	14,92	15,12	14,78	14,3	14,66	14,51	14,87	13,47	13,96	15,45	15,54	16,14	15,28	14,38
FeO %	2,98	2,13	1,87	0,88	1,62	2,14	1,28	1,14	1,7	2,7	2,61	3,32	2,63	1,35
Fe ₂ O ₃ %	2,33	2,45	1,72	1,29	1,97	2,03	1,07	1,47	1,84	2,71	1,75	2,06	2,59	1,55
MnO %	0,09	0,08	0,08	0,04	0,08	0,09	0,05	0,06	0,09	0,1	0,09	0,11	0,09	0,07
MgO %	2,23	1,5	1,18	0,44	0,9	1,34	0,58	1,14	1,7	1,87	1,37	1,8	2,38	1,52
CaO %	5,05	4,17	3,47	2,38	3,54	3,7	3,15	3,03	3,66	4,94	4,2	4,87	4,48	4,77
Na ₂ O %	2,47	3,09	3,16	3,69	3,29	3,21	3,53	3,54	3,27	3,07	2,95	3	2,6	3,14
K ₂ O %	2,55	2,54	3,01	2,41	2,39	3	2,47	2,65	2,47	2,15	2,51	2,29	2,58	1,49
P ₂ O ₅ %	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,05	0,07	0,05	0,04	0,05	0,05	0,11
Ppc %	1,15	1,05	1,09	0,71	0,95	0,65	0,61	0,63	0,69	0,72	0,69	0,76	1,85	0,95
Total %	99,6	99,52	99,55	99,53	99,53	99,58	99,54	99,44	99,3	99,61	99,56	99,57	99,87	99,94
Cu ppm	21	15	12	713	576	140	98	34	<5	28	14	73	10	22
V ppm	76	69	55	35	60	83	34	36	48	86	51	68	68	69
Cr ppm	152	133	117	164	108	105	123	29	19	198	213	240	221	22
Co ppm	15	12	11	7	11	13	8	6	6	15	13	15	15	9
Ni ppm	62	62	55	57	55	57	57	12	9	56	56	58	70	11
Zn ppm	44	73	64	604	541	168	99	39	47	69	59	95	54	49
Rb ppm	76	77	106	76	79	105	99	54	46	79	86	72	80	33
Sr ppm	241	260	364	165	171	162	243	43	65	150	100	111	184	272
Y ppm	31	32	40	<10	<10	30	21	60	16	31	29	28	33	76
Zr ppm	82	96	96	75	66	90	62	192	100	88	65	68	112	557
Nb ppm	4	4	6	2	3	4	2	2	2	4	4	4	6	8
Ba ppm	642	687	728	764	753	692	768	203	267	692	730	885	759	424
Pb ppm	<10	<10	17	27	23	<10	<10	<5	32	42	11	107	13	30

Tierras raras (ppm)														
Plutón	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Pingo-Pingo	24,29	48,8	5,23	19,72	3,76	0,68	3,86	0,7	4,25	0,9	2,8	0,42	2,83	0,45
Pedregoso	29,98	62,53	5,84	20,99	3,56	0,62	3,03	0,5	3,08	0,62	1,93	0,31	2,1	0,29
Choschas	15,22	34,01	3,51	13,27	2,45	0,65	2,64	0,46	2,77	0,59	1,78	0,28	1,98	0,27
El León	12,47	26,68	3,15	14,26	2,86	1,19	3,07	0,57	3,46	0,73	2,21	0,31	2,04	0,36

TABLA 2. ANÁLISIS QUÍMICOS DE MONZOGRANITOS DEL BATOLITO CAMBRO-ORDOVÍCIO DEL CORDÓN DE LILA Y SIERRA DE ALMEIDA.

Plutón	Tucúcaro				Tilopozo		Portezuelo	Tambillo						Alto del Inca
Muestra	MC02	MC05	MC19	MC09	MC19	Tilo 1	GRG1	6.2	7.1	10.3	10.7	10.1	11.3	AI-1
SiO ₂ %	74,95	74,72	74,67	76,4	74,91	75,31	77,02	76,09	75,59	76,77	74,46	74,5	74,83	76,72
TiO ₂ %	0,1	0,09	0,09	0,07	0,08	0,11	<0,02	0,07	0,15	0,05	0,17	0,13	0,12	0,14
Al ₂ O ₃ %	13,79	13,94	13,28	13,1	13,83	13,93	12,22	12,99	13,02	12,7	13,32	13,2	13,21	12,42
FeO %	0,58	0,54	0,57	0,37	0,27	0,24	0,84	0,22	0,38	0,08	0,88	0,66	0,85	1,04
Fe ₂ O ₃ %	0,91	0,89	0,96	0,25	0,39	0,44	0,33	0,52	0,61	0,38	0,64	0,51	0,13	0,2
MnO %	0,05	0,05	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,03	0,08	0,06	0,04
MgO %	0,15	0,15	0,16	0,06	0,03	0,06	0,06	0,04	0,04	0,03	0,08	0,06	0,06	0,04
CaO %	0,87	0,9	1,1	0,61	0,5	0,66	0,27	0,59	1,18	0,38	1,15	1,31	1,21	0,37
Na ₂ O %	4,13	4,36	4,34	3,54	3,88	3,52	3,62	4,24	3,78	3,86	3,5	3,62	3,73	3,66
K ₂ O %	3,66	3,79	3,89	4,71	4,97	5,1	4,18	4,41	4,5	4,87	4,41	4,75	4,58	3,92
P ₂ O ₅ %	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,08	0,07	0,06	0,08	0,06	0,06	0,02
ppc %	0,46	0,47	0,44	0,78	0,51	0,5	0,97	0,23	0,37	0,24	0,74	0,51	0,54	1,23
Total %	99,67	99,91	99,58	99,93	99,51	99,97	99,71	99,66	99,93	99,47	99,96	99,61	99,57	99,84
Cu ppm	19	12	18	12	18	16	<5	7	11	7	12	6	7	<5
V ppm	9	10	7	1	7	5	<10	7	12	6	25	10	7	<10
Cr ppm	103	128	125	207	125	119	48	295	315	277	332	272	240	14
Co ppm	6	6	6	4	6	4	<5	0	0	0	0	0	0	<5
Ni ppm	55	54	56	57	56	57	<5	2	3	4	3	4	4	<5
Zn ppm	69	59	57	<5	57	4	29	8	21	8	85	30	46	30
Rb ppm	131	135	130	307	130	263	224	179	135	204	148	134	133	134
Sr ppm	31	23	22	<5	22	<5	<5	45	55	21	68	76	79	<5
Y ppm	62	10	61	104	61	83	52	45	31	43	37	28	28	28
Zr ppm	61	54	46	18	46	17	72	78	99	81	100	97	89	101
Nb ppm	5	6	7	16	7	10	23	6	2	14	5	3	3	5
Ba ppm	1.000	982	1.010	674	1.010	674	240	264	552	246	368	635	588	965
Pb ppm	58	50	60	38	60	62	28	13	14	23	33	24	22	23

Tierras raras (ppm)														
Plutón	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Tilopozo	14,81	48,78	6,64	26,04	7,36	0,12	5,34	0,76	4,02	0,69	1,87	0,35	2,59	0,43
Tucúcaro	25,53	63,08	6,79	27,71	5,87	0,83	6,84	1,25	7,42	1,52	4,39	0,71	4,78	0,66
Portezuelo	21,3	50,42	5,82	20,68	5,12	0,27	3,9	0,66	3,84	0,82	2,32	0,41	2,77	0,46
Tambillo	24,68	51,15	5,42	17,85	3,2	0,6	2,83	0,46	2,83	0,55	2	0,27	1,94	0,33
Alto del Inca	25,1	56,05	5,83	20,84	3,96	0,89	2,54	0,38	1,76	0,34	1,04	0,16	0,87	0,21

FIG. 4. Diagramas de Harker para elementos mayores de granodioritas (círculos vacíos) y de monzogranitos (círculos llenos), contenidos en peso%.

FIG. 5. **A.** Diagrama $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}-\text{CaO}$ versus SiO_2 de Frost *et al.* (2001) para las granodioritas (círculos vacíos) y para los monzogranitos (círculos llenos), contenidos en peso %. **B.** Distribución de las granodioritas (círculos vacíos) y de los monzogranitos (círculos llenos) en el diagrama de SiO_2 versus K_2O (Rickwood, 1989), contenidos en peso %. **C.** Diagrama de Shand (1943), A/NK versus A/NKC , para granodioritas y monzogranitos. La división transversal es tomada de Maniar y Piccoli (1989).

4.2. Elementos en trazas

Se observa una diferencia notable entre los contenidos de los elementos en trazas de ambas litologías. En la figura 6 se indican las variaciones de algunos de estos elementos *versus* el contenido en SiO_2 . El Rb se enriquece en forma hiperbólica con el incremento del contenido de SiO_2 , desde las granodioritas hacia los monzogranitos (Fig. 6). El Sr de las granodioritas tiene una amplia dispersión, pero de modo general muestra una tendencia descendente con el incremento del contenido de SiO_2 . Para los monzogranitos, el Sr desciende linealmente dentro de su estrecho contenido de sílice (Fig. 5). La distribución de Nb es ligeramente descendente con el incremento de SiO_2 para las granodioritas, y en los monzogranitos asciende linealmente entre 1 y 24 ppm dentro de su estrecho rango del contenido de SiO_2 (Fig. 6).

Los únicos plutones para los cuales se dispone de razones iniciales de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ son el Plutón Tucúcaro (0,7102) y el Plutón Tilopozo (0,7113), (Mpodozis *et al.*, 1983).

4.3. Tierras raras

Los patrones de tierras raras normalizados a los valores de condrito (Boynnton, 1984), muestran que las granodioritas se caracterizan por un enriquecimiento de las tierras raras livianas (TRL) con respecto a las pesadas (TRP) y una anomalía de Eu menor (Fig. 7A). Las primeras presentan un patrón inclinado con un marcado descenso desde La a Sm y una disposición horizontal de las TRP con una anomalía negativa leve de Eu, incluso positiva en el caso del Plutón El León, entre ambas. Los monzogranitos presentan un patrón de distribución ligeramente enriquecido en TRL respecto a las TRP, caracterizado por una conspicua anomalía negativa de Eu (Fig. 7B).

5. Discusión

Sobre la base de las observaciones en terreno y los antecedentes petrológicos, Otamendi *et al.* (2010) y Ducea *et al.* (2015) han propuesto un modelo que explica el origen y naturaleza de las rocas plutónicas del arco magmático famatiniano presentes en las

FIG. 6. Diagramas de Harker correspondientes a algunos elementos en trazas, contenidos en ppm. Granodioritas (círculos vacíos) y monzogranitos (círculos llenos), contenidos de SiO_2 en peso%.

FIG. 7. **A.** Diagrama de tierras raras para granodioritas. **B.** Diagrama de tierras raras para monzogranitos. Contenidos de los elementos de las tierras raras normalizados a condrito (Boynton, 1984).

sierras pampeanas occidentales, noroeste de Argentina. Dicho modelo plantea que las rocas plutónicas calcoalcalinas del arco se habrían generado mediante procesos de cristalización fraccionada a partir de un magma básico, acompañados por procesos de contaminación/asimilación de metasedimentitas pertenecientes a la Formación Puncoviscana y/o interacción con fundidos félsicos originados en la corteza. Este modelo explica, en particular, el hecho de que las granodioritas y las monzonitas presentan un *trend* composicional que atraviesa el límite entre los campos metaluminoso y peraluminoso, por lo cual la explicación más simple para la generación de dichas secuencias es la interacción entre magmas de composición calcoalcalina y fundidos corticales o rocas de la corteza sedimentaria (Otamendi *et al.*, 2012).

Este modelo petrogenético es aplicable a las rocas estudiadas en el presente trabajo, dado que las granodioritas se distribuyen en el campo metaluminoso con transición al campo peraluminoso en el diagrama de Shand (1943) (Fig. 5C). En cuanto a los monzogranitos, su carácter peraluminoso, unido a las altas razones iniciales de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$, sugieren una contaminación con rocas sedimentarias corticales posiblemente representadas por el *roof-pendant* observado en el Plutón Tambillo y que serían un equivalente de la Formación Puncoviscana, la cual constituye el basamento sobre el que se emplazó el arco magmático famatiniano (Niemeyer, 2013).

Las granodioritas y los monzogranitos objeto de este estudio parecen haberse originado a partir de un magma calcoalcalino común que evolucionó a través de un proceso de cristalización fraccionada. Este origen

común es respaldado por el comportamiento de los elementos mayores y en trazas en los diagramas de Harker (Figs. 4 y 6) y por los patrones normalizados de los elementos de las tierras raras (Fig. 7). Estos son compatibles con una evolución por cristalización fraccionada de plagioclasa de los magmas. La pronunciada anomalía de Eu observada en las muestras de los monzogranitos refuerza esta sugerencia (Fig. 7). En efecto, la cristalización temprana de plagioclasa, por ejemplo en las granodioritas, contribuye a secuestrar el Eu del líquido residual, lo que explica la anomalía negativa en los monzogranitos y el predominio de feldespato potásico sobre plagioclasa en esta litología (Figs. 2 y 7) (Cullers y Graf, 1984). Lo anterior es también compatible con el descenso del contenido de CaO y Sr, con el incremento de SiO_2 observado en los diagramas de Harker, y con la abundante cristalización de feldespato potásico en los monzogranitos. El cambio de comportamiento de todos estos elementos durante el proceso de cristalización sugiere un enriquecimiento de los elementos incompatibles, por ejemplo K_2O , Rb y Nb en el líquido residual (*e.g.*, Rollinson, 1993; Lee y Morton, 2015), los cuales habrían pasado a formar parte de los monzogranitos.

6. Conclusión

El batolito del Cordón de Lila y Sierra de Almeida, ubicado al sur del salar de Atacama en el norte de Chile, está constituido por una serie de plutones de composición granodiorítica y monzogranítica, emplazados en una corteza siálica (principalmente sedimentaria) durante el Cámbrico Superior-Ordovícico.

Ellos forman parte del arco magmático famatiniano y representan su borde occidental.

La composición química de los plutones (elementos mayores, en trazas y tierras raras) sugiere que tanto los plutones granodioríticos como los monzograníticos se formaron por cristalización fraccionada a partir de un magma máfico común. El carácter metaluminoso de las granodioritas y peraluminoso de los monzogranitos puede ser explicado por diferentes grados de interacción del magma con las rocas corticales sedimentarias.

Agradecimientos

Se agradece la revisión crítica del manuscrito por parte de L. Baeza, V. Oliveros, J. Muñoz, I. Urraza y W. Vivallo. Los dibujos se deben a L. Jofré, de la Universidad Católica del Norte.

Referencias

- Aceñolaza, F.; Aceñolaza, G. 2005. La Formación Puncovicana y unidades estratigráficas vinculadas en el Neoproterozoico-Cámbrico temprano del Noroeste Argentino. *Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis* 12 (2): 65-87.
- Bahlburg, H.; Hervé, F. 1997. Geodynamic evolution and tectonostratigraphic terranes of northwestern Argentina and northern Chile. *Geological Society of America Bulletin* 109 (7): 869-884. doi:10.1130/0016-7606(1997)109<0869:GEATTO>2.3.CO;2.
- Boynton, W.V. 1984. Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In *Rare earth element geochemistry* (Henderson, P.; editor). Elsevier: 63-114.
- Carrasco, J.L. 2015. La Granodiorita El León, extremo sureste del Cordón de Lila, Región de Antofagasta, Chile. Memoria de título (Inédita), Universidad Católica del Norte: 52 p.
- Cullers, R.L.; Graf, J.L. 1984. Rare Earth elements in igneous rocks of the continental crust: intermediate and silicic rocks-ore petrogenesis. In *Rare Earth Element Geochemistry* (Henderson, P.; editor). Elsevier: 275-316.
- Ducea, M.N.; Otamendi, J.E.; Bergantz, G.W.; Jianu, D.; Petrescu, L. 2015. The origin and petrologic evolution of the Ordovician Famatinian-Puna arc. In *Geodynamics of a Cordilleran Orogenic System: The Central Andes of Argentina and Northern Chile* (DeCelles, P.G.; Ducea, M.N.; Carrapa, B.; Kapp, P.A.; editores). *Geological Society of America Memoir* 212: 125-138.
- Frost, B.R.; Barnes, C.G.; Collins, W.J.; Arculus, R.J.; Ellis, D.J.; Frost, C.D. 2001. A Geochemical Classification for Granitic Rocks. *Journal of Petrology* 42 (11): 2033-2048.
- Lee, C.T.A.; Morton, D.M. 2015. High silica granites: Terminal porosity and crystal settling in shallow magma chambers. *Earth and Planetary Science Letters* 409: 23-31. doi: 10.1016/j.epsl.2014.10.040.
- Maniar, P.D.; Piccoli, P.M. 1989. Tectonic discrimination of granitoids. *Geological Society of America Bulletin* 101 (5): 635-643. doi: 10.1130/0016-7606(1989)101<0635:TD OG>2.3.CO;2.
- Mpodozis, C.; Hervé, F.; Davidson, J.; Rivano, S. 1983. Los granitoides de Cerro Lila, manifestaciones de un episodio intrusivo y termal del Paleozoico inferior en los Andes del Norte de Chile. *Revista Geológica de Chile* 18: 3-14. doi: 10.5027/andgeoV10n1-a01.
- Niemeyer, H. 1989. El Complejo ígneo-sedimentario del Cordón de Lila, Región de Antofagasta: significado tectónico. *Revista Geológica de Chile* 16 (2): 163-181. doi: 10.5027/andgeoV16n2-a03.
- Niemeyer, H. 2013. Geología del Área Cerro Lila-Peine, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 147: 37 p., 1 mapa escala 1: 100.000.
- Niemeyer, H.; Meffre, S.; Guerrero, R. 2014. Zircon U-Pb geochronology of granitic rocks of the Cordón de Lila and Sierra de Almeida ranges, northern Chile: 30 m.y. of Ordovician plutonism on the western border of Gondwana. *Journal of South American Earth Sciences* 56: 228-241. doi: 10.1016/j.jsames.2014.09.011.
- Niemeyer, H.; Götze, J.; Sanhueza, M.; Portilla, C. 2018. The Ordovician magmatic arc in the northern Chile-Argentina Andes between 21° and 26° south latitude. *Journal of South American Earth Sciences* 81: 204-214. doi: 10.1016/j.jsames.2017.11.016.
- Otamendi, J.E.; Pinotti, L.P.; Basei, M.A.S.; Tibaldi, A.M. 2010. Evaluation of petrogenetic models for intermediate and silicic plutonic rocks from the Sierra de Valle Fértil-La Huerta, Argentina: Petrologic constraints on the origin of igneous rocks in the Ordovician Famatinian- Puna paleoarc. *Journal of South American Earth Sciences* 30: 29-45. doi: 10.1016/j.jsames.2010.07.004.
- Otamendi, J.E.; Ducea, M.N.; Bergantz, G.W. 2012. Geological, Petrological and Geochemical Evidence for Progressive Construction of an Arc Crust Section, Sierra de Valle Fértil, Famatinian Arc, Argentina. *Journal of Petrology* 53 (4): 761-800. doi: 10.1093/petrology/egr079.

- Palma, M.A.; Parica, P.D.; Ramos, V.A. 1986. El Granito Archibarca: su edad y significado tectónico, Provincia de Catamarca. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* XLI (3-4): 414-419.
- Pankhurst, R.J.; Hervé, F.; Fanning, C.M.; Calderón, M.; Niemeyer, H.; Griem-Klee, S.; Soto, F. 2016. The pre-Mesozoic rocks of northern Chile: U-Pb ages, and Hf and O isotopes. *Earth Science Reviews* 152: 88-105. doi: 10.1016/j.earscirev.2015.11.009.
- Ramos, V. 2018. The Famatinian Orogen along the protomargin of western Gondwana: evidence of nearly continuous Ordovician magmatic arc between Venezuela and Argentina. *In* The evolution of the Chilean-Argentinean Andes (Folguera, A.; Contreras-Reyes, E.; Neredia, N.; Encinas, A.; Iannelli, S.B.; Oliveros, V.; Dávila, F.M.; Collo, G.; Giambiagi, L.; Maksymowicz, A.; Iglesia Llanos, M.P.; Turienzo, M.; Naipauer, M.; Orts, D.; Litvak, V.D.; Álvarez, O.; Arriagada, C.; editors). Springer: 133-161.
- Rickwood, P.C. 1989. Boundary lines within petrologic diagrams which use oxides of major and minor elements. *Lithos* 22 (4): 247-263. doi: 10.1016/0024-4937(89)90028-5.
- Rollinson, H. 1993. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Pearson, Prentice Hall: 352 p.
- Shand, S. 1943. Eruptive Rocks: their genesis, composition, and classification, with a chapter on meteorites. John Wiley and Sons: 444 p.
- Streckeisen, A. 1974. Rocas plutónicas. Clasificación y nomenclatura recomendada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (I.U.G.S.). Subcomisión en sistemática de rocas ígneas. Traducido al Castellano de Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, Instituto de Investigaciones Geológicas 107: 144-240. Santiago.
- Valencia, E. 2014. Caracterización geológico-estructural del borde norte del Plutón Pingo-Pingo y su aureola de contacto, Cordón de Lila, Región de Antofagasta. Memoria de título (Inédito), Universidad Católica del Norte: 134 p.
- Zimmermann, U.; Niemeyer, H.; Meffre, S. 2010. Revealing the continental margin of Gondwana: the Ordovician arc of the Cordón de Lila (northern Chile). *International Journal of Earth Sciences* 99: 39-56. doi: 10.1007/s00531-009-0483-8.